

Centro de Endoscopia

11 3549 1428

Agendamento de Exames

11 3549 1000

pulmonar, que serão enviados para análise de um patologista e/ou laboratório de análises clínicas. Lembre-se que biópsias podem ser realizadas por várias razões, como para inflamações, retiradas de pólipos, não significando necessariamente suspeita de câncer.

Quando houver biópsia, medicações como Conadem, Marevam, Plavix-Clopidogel (anticoagulantes) devem ser suspensas de 7 a 10 dias antes do procedimento. E o seu médico deverá ser consultado antes da suspensão.

Esse procedimento é realizado no Centro de Endoscopia, com o paciente ficando em observação no próprio setor (recebendo alta após algumas horas).

Quais são os principais riscos?

As complicações relacionadas à sedação intravenosa são raras e de solução imediata, uma vez que ela é realizada por um médico.

São raras as complicações, mas pode haver:

- Flebite (inflamação no local da aplicação da medicação);
- Dor torácica;
- Náuseas e vômitos;
- Pode ocorrer depressão respiratória;
- Sonolência;
- Em 2% dos casos podem ocorrer perfurações (como pneumotórax e hemorragias), requerendo internação e eventual tratamento cirúrgico (colocação de catéter para drenagem de pneumotórax), se necessário.

Sinais de alerta a serem observados:

- Sangramento;
- Temperatura maior que 38 °C.

Os sangramentos tardios são raros, e podem manifestar-se com dor local e sinais de baixa pressão arterial (como desmaios e tonturas ao levantar).

Cuidados após o procedimento nas primeiras 12h

- a. Não há restrição alimentar ou ao banho após o exame;
- b. A ingestão de bebidas alcoólicas deverá ser evitada;
- c. Há restrição à atividade física;
- d. Não se pode dirigir ou trabalhar no dia do exame. Se necessário, solicitar atestado médico;
- e. Se ocorrer dor torácica após o exame, o paciente deverá procurar serviço de emergência para a realização de RX de tórax avaliando-se a possibilidade de pneumotórax;
- f. O uso de anticoagulantes deverá ser analisado caso a caso, entre o médico endoscopista e o médico do paciente.

Se houver qualquer suspeita de complicação ligue para seu médico, procure o Pronto Atendimento do hospital, ou entre em contato com o médico que realizou o procedimento.

Resultado:

Retirada após três dias úteis na Recepção do bloco B.

Dúvidas sobre o preparo, ligar no telefone **11 3549 1428**.

De 2ª a 6ª feira das 6h às 20h ou aos sábados das 6h às 18h.



OSWALDO CRUZ
HOSPITAL ALEMÃO

Rua João Julião, 331 • Paraíso
CEP 01323 903 • São Paulo • SP
Fone: 11 3549 1000 • Fax: 3287 8177
www.hospitalalemao.org.br